

## Invaginación intestinal atípica en lactante

**Yurieenk Cordovés Almaguer,  
Amilkar Suárez Pupo,  
Rosa Alexandra Cstévez Bedón,  
Laura Marcela Montalvo Escobar**

La invaginación intestinal constituye una urgencia quirúrgica y la causa más frecuente de oclusión intestinal en lactantes y niños menores de 2 años.

Se define como la introducción de un segmento de intestino y su mesenterio en otro, en forma telescópica.

El caso clínico que se presenta muestra una forma atípica de esta enfermedad.

### **Presentación del caso:**

Lactante masculino de 6 meses de edad, raza blanca, de procedencia rural, con antecedentes de infección respiratoria alta (catarro común) 10 días antes, eutrófico.

Presenta somnolencia y vómitos de color bilioso.

Al examen físico: lactante letárgico que realiza apertura ocular en respuesta a estímulos. Llanto débil. Abdomen ligeramente distendido, blando, no visceromegalia, no reacción peritoneal, no se palpa tumor abdominal.

Se realiza tacto rectal donde se halla esfínter tónico y ampolla rectal vacía.

La ecografía abdominal detecta imagen sugestiva de invaginación intestinal y se establece el diagnóstico presuntivo.

En el acto quirúrgico se confirma dicho diagnóstico y se descubre la presencia de adenopatías mesentéricas como factor desencadenante.

### **Conclusiones:**

La invaginación intestinal. debe sospecharse siempre en todo lactante que presente cuadro de infección viral con letargia y vómitos biliosos, debido a la posibilidad de que las adenopatías presentes en el mesenterio se hipertrofien y actúen como cabeza invaginante y originen la invaginación intestinal.

Un diagnóstico oportuno y un manejo adecuado pueden evitar graves complicaciones, incluso la muerte.

**(Solicite el texto completo a [info@tuconsultorioidigital.com.ar](mailto:info@tuconsultorioidigital.com.ar))**